

La mela di qualità

- NUTRIZIONE AZOTATA SENZA ECCESSI E CARENZE
- FAVORISCE LA DECOMPOSIZIONE DEI RESIDUI COLTURALI
- CALCIO PER UNA QUALITÀ SUPERIORE
- OTTIMI RISULTATI NELLA RESA E NELLA QUALITÀ

QUALITY
MADE IN
GERMANY




alzchem
group

SVILUPPO VEGETATIVO, RESA E QUALITÀ

La Calciocianamide Perlka® mette a disposizione delle piante azoto in modo regolare evitando eccessi o carenze, permettendo uno sviluppo vegetativo ed una produzione ottimale. Con l'utilizzo di Calciocianamide Perlka® viene messa a disposizione della pianta anche una buona quantità di calcio. Per il melo il calcio è un elemento fondamentale per l'accrescimento dei tessuti fogliari e per lo sviluppo dell'apparato radicale oltre che per migliorare la qualità dei frutti e per prevenire la buttersatura amara ed altre fisiopatie.

Il calcio della Calciocianamide Perlka®, disponibile fin da subito, è facilmente assimilabile e trasportabile nei frutti già a partire dalle prime fasi di sviluppo quando è maggiormente necessario per migliorare la qualità delle produzioni. I risultati di diverse prove condotte nelle principali aree di produzione, hanno inoltre dimostrato che il contenuto in sostanza secca nei frutti risulta tendenzialmente sempre più elevato nelle tesi trattate con Calciocianamide Perlka® rispetto a quelle concimate con altri prodotti.

EFFETTI DI PERLKA® SULL'INCREMENTO DI SOSTANZA SECCA NEI FRUTTI DI MELO (GOLDEN DELICIOUS INNESTATA SU M9)



Fonte: Edmund Mach – Istituto Agrario di San Michele all'Adige

Tesi	Prodotto	Note
1	Perlka® + 5 concimazioni fogliari con calcio a partire da inizio Guigno	In tutte le tesi le concimazioni sono state gestite in modo da distribuire 20 kg/ha di azoto a BBCH 10 (orecchie di topo) e 20 kg/ha di azoto circa 1 mese dopo.
2	Perlka®	
3	NPK 6-12-18 + 5 concimazioni fogliari con calcio a partire da inizio Guigno	
4	NPK 6-12-18	

CONSIGLI DI TECNICA APPLICATIVA SU MELO

Fase di allevamento

In questa fase adeguare la quantità di Perlka® da distribuire alle reali esigenze in azoto della coltura. Applicare il prodotto in maniera uniforme sulla fila ca. 10 giorni prima della ripresa vegetativa.

Fase produttiva

Distribuire 250 kg/ha di Perlka® ca. 10 giorni prima della ripresa vegetativa a pieno campo. Completare la concimazione azotata a fine fioritura/inizio allegagione con altri concimi contenenti azoto.

Leggere e seguire attentamente tutte le indicazioni riportate sul sacco.



La Calciocianamide Perlka® è approvata come concime solido puro per macronutrienti inorganici (PFC 1(C)(I)(a)(i)) secondo il Regolamento (UE) 2019/1009. Contiene il 19,8% di N totale e l'1,8% di nitrato-N. Contiene inoltre il 48% di CaO (principi attivi alcalini). Se è necessario, integrare la concimazione con calciocianamide con altri fertilizzanti.

FABBRICANTE

Alzchem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32
83308 Trostberg, Germany
alzchem.com

CONSULENZA PER ITALIA

Dr. Saverio D'Onza
Via Vespucci 42 | 56100 Pisa, Italy
T +39 347 7366995
saverio.donza@extern.alzchem.com



alzchem.com/it