

Il pomodoro da industria di qualità

- MIGLIORAMENTO DEI PARAMETRI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
- NUTRIZIONE AZOTATA SENZA ECCESSI O CARENZE
- OTTIMA PREVENZIONE DEL MARCIUME APICALE
- MATURAZIONE PIÙ UNIFORME

QUALITY
MADE IN
GERMANY




alzchem
group

MASSIME RESE ED OTTIMA QUALITÀ

La calciocianamide Perlka®, grazie sia all'azione nutritiva dell'azoto a lento rilascio, del calcio e all'attività a favore della salute delle piante, permette una crescita equilibrata del pomodoro, una resa costante ed elevata ed una qualità delle bacche in grado di soddisfare tutte le esigenze di mercato.


Fonte: Prova concimazione con Perlka® - Sele Agroresearch S.r.l. - Italia 2018

Produzione (t/ha) di pomodoro da industria in campi concimati con Perlka®



CALCIO FACILMENTE ASSIMILABILE

Incidenza di marciume apicale su pomodoro da industria concimato con Perlka® (40 frutti/pianta)



Il calcio è essenziale per alcune importanti funzioni fisiologiche come la respirazione. Inoltre è determinante per il turgore cellulare e la robustezza della membrana cellulare della pianta del pomodoro. Associato al mancato assorbimento del calcio è il marciume apicale ed una scarsa consistenza dei frutti. La Calciocianamide Perlka® mette il calcio a disposizione della coltura allo stato ionico facilmente assimilabile a beneficio della produttività e della qualità del raccolto.

Fonte: Prova concimazione con Perlka® - Sele Agroresearch S.r.l. - Italia 2018

CONSIGLI DI TECNICA APPLICATIVA SU POMODORO DA INDUSTRIA

Applicazione a spaglio in pieno campo

Dosaggio

300–500 kg/ha di Calciocianamide Perlka® (equivalente a 80–100 kg/ha di azoto)

Periodo

10–15 giorni prima del trapianto a pieno campo

Altre indicazioni

Interrare la Calciocianamide Perlka® a 5 - 8 cm. Tenere il terreno leggermente umido i primi giorni dopo la distribuzione.

Attenzione

Leggere e seguire attentamente tutte le indicazioni evidenziate in etichetta sul sacco.

Applicazione post trapianto

Dosaggio

200–250 kg/ha di Calciocianamide Perlka® (equivalente a 40–60 kg/ha di azoto)

Periodo

10–20 giorni dopo il trapianto

Altre indicazioni

Distribuire la Calciocianamide Perlka® localizzata alla rincalzatura ad una distanza di 10–15 cm dalla pianta avendo cura di evitare il contatto con la pianta. Se necessario completare il fabbisogno in azoto con altri concimi azotati.

La Calciocianamide Perlka® è approvata come concime solido puro per macronutrienti inorganici (PFC 1(C)(I)(a)(i)) secondo il Regolamento (UE) 2019/1009. Contiene il 19,8% di N totale e l'1,8% di nitrato-N. Contiene inoltre il 48% di CaO (principi attivi alcalini). Se è necessario, integrare la concimazione con calciocianamide con altri fertilizzanti.



FABBRICANTE
Alzchem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32
83308 Trostberg, Germany
alzchem.com

CONSULENZA PER ITALIA
Dr. Saverio D'Onza
Via Vespucci 42 | 56100 Pisa, Italy
T +39 347 7366995
saverio.donza@extern.alzchem.com

