

Sitofex®



Lotta al cancro batterico dell'actinidia – PSA

UNICO PRODOTTO A BASE DI CPPU
REGISTRATO PER IL CONTENIMENTO
DEI SINTOMI DI PSA



alzchem
group



EFFETTI DEL SITOFEX® IN PREFIORITURA SULLA PERCENTUALE DI FOGLIE INFETTE DA PSA

Prova (località e anno)	Controllo	*Sitofex®	*Sitofex® + rame
Faenza 2014	36,9	12,9	-
Faenza 2015	60,5	27,5	-
Castel Bolognese 2015	47,5	13,5	-
Faenza 2016	28,5	14,5	2,0
Castel Bolognese 2016	41,0	13,0	9,0
Fossolo di Faenza 2016	56,5	17,5	14,5
Velletri 2016	57,0	31,5	22,0
Borgo Montello 2016	34,0	6,5	4,5
Valori medi	45,2	17,5	10,4

* I dati riportano i risultati ottenuti con Sitofex® applicato due volte in prefioritura a un dosaggio di 666 ml/ha per ciascuna applicazione senza e in abbinamento ad un formulato rameico.




Foglie trattate
con Sitofex® per
il contenimento
di PSA

Da studi effettuati, con l'impiego di Sitofex® è stato possibile ridurre la percentuale di foglie con sintomi da PSA mediamente sino al 60%. L'applicazione in strategia con un formulato rameico ha ottenuto la riduzione delle foglie con sintomi fino al 77%.

EFFETTI DEI TRATTAMENTI CON SITOFEX® IN PREFIORITURA SUL CALIBRO DEI FRUTTI

Dai dati delle prove si evince che l'impiego di Sitofex® in prefioritura per attivare i meccanismi di difesa delle piante contro il PSA, svolge un effetto positivo sul calibro dei frutti. L'incremento del calibro non raggiunge quello ottenuto con l'applicazione in post-fioritura, ma risulta comunque apprezzabile.



COME FUNZIONA SITOFEX® CONTRO LA PSA?

- Sitofex®, non agisce contro il patogeno ma rende i suoi attacchi notevolmente meno dannosi.
- Sitofex®, applicato prima dell'attacco, promuove le autodifese delle piante di actinidia per il contenimento dei sintomi di PSA.
- La maggiore protezione degli organi verdi (germogli e foglie) trattati è riscontrabile già dopo alcuni giorni dall'applicazione di Sitofex® (ca. 7 giorni).
- I tessuti della pianta risultano più protetti contro la PSA.
- I sintomi manifestati risultano ridotti in modo significativo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI



Limite Massimo di Residuo

Il Limite Massimo di Residuo (LMR) di forchlorfenuron, principio attivo del Sitofex®, fissato in Unione Europea su kiwi è di 0,01 mg/kg. Questo limite viene rispettato sia con l'applicazione in prefioritura contro il PSA oppure, in alternativa, con l'applicazione per il miglioramento del calibro se sono rispettati i dosaggi ed i periodi applicativi indicati in etichetta.

Attenzione!

La quantità di prodotto utilizzabile per ettaro e per anno non deve superare 1,3 Litri. Pertanto, se il prodotto viene impiegato in prefioritura per attivare le autodifese naturali delle piante, non può più essere utilizzato per l'incremento del calibro in post-fioritura.



TECNICA APPLICATIVA DEL SITOFEX® CONTRO LA PSA

2 trattamenti in prefioritura		
1° trattamento	Periodo:	3 - 5 foglie / germoglio
	Dosaggio:	Sitofex® 0,6 l/ha
2° trattamento	Periodo:	3 settimane dopo
	Dosaggio:	Sitofex® 0,7 l/ha
Per ciascun trattamento	Bagnare bene tutte le parti verdi delle piante (miscela 800 - 1.000 l/ha)	

Il prodotto può essere applicato su *Actinidia chinensis* e *deliciosa*. Non applicare sulla varietà *Soreli* – Effettuare il 2° trattamento non oltre 10 giorni prima dell'inizio della fioritura – Per le varietà di nuova introduzione, consultare il servizio tecnico. Nelle prove si è visto che l'abbinamento di Sitofex® a prodotti rameici migliora i risultati.



Inserito nei Disciplinari di produzione Integrata. Aut. Ministero della Salute n. 12828 del 02/10/2006. Estensione per l'uva da tavola autorizzata il 16/01/2012. Estensione d'impiego contro la PSA del kiwi autorizzata in data 11/12/2024.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

0	1	5				6	7		
Riposo vegetativo	Apertura foglie	Rigonfiamento e sviluppo gemme floreali				Fioritura	Accrescimento frutto		
00	11	51	53	55	59	69	71	73	79
Primo trattamento		Secondo trattamento							
Sitofex®		Sitofex®							

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Sitofex®, alla luce dei numerosi dati di ricerca disponibili, viene considerato un utile strumento preventivo da integrare alle misure agronomiche e di prevenzione alla PSA raccomandate dai Servizi Fitosanitari e dai tecnici.
- Sitofex® ha una modalità di azione completamente diversa dai prodotti rameici ai quali può essere efficacemente integrato.
- Le prove con Sitofex® per il contenimento PSA dal 2014 al 2016 sono state eseguite sulla cv. Hayward. Gli effetti sulle varietà di nuova introduzione sono in corso di valutazione.
- Leggere e seguire attentamente tutte le indicazioni evidenziate in etichetta.

FABBRICANTE
Alzchem Trostberg GmbH
 Dr.-Albert-Frank-Straße 32
 83308 Trostberg, Germany
alzchem.com

CONSULENZA PER ITALIA
 Dr. Saverio D'Onza
 Via Vespucci 42 | 56100 Pisa, Italy
 T +39 347 7366995
saverio.donza@extern.alzchem.com



alzchem.com/it